

# RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DE Balsa Nova

TARDE

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

QUESTÃO 26 – MANTER

**JUSTIFICATIVA:** O fato de não estar explícito na alternativa que se trata de mosquito fêmea não altera o sentido da mesma nem a torna incorreta.

O Manual de referência cita “A transmissão se faz através da picada de mosquitos, como o *Aedes aegypti* (febre amarela urbana) e várias espécies de *Haemagogus* (febre amarela silvestre)”.

CARGO MÉDICO CLÍNICO GERAL  
PLANTONISTA

### **QUESTÃO 26 – MANTER**

**JUSTIFICATIVA:** (De acordo com a Lei nº 8.080/90 no campo de atuação do Sistema Único de Saúde está incluída a **formulação e execução** da política de sangue e seus derivados. Na alternativa “b” foi apresentada de forma incorreta sua atuação como a de **fiscalizar e colaborar na execução**).

### **QUESTÃO 31 – MANTER**

**JUSTIFICATIVA:** (Todas as alternativas estão corretas e de acordo com as **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma** – 2012. J Bras Pneumol. v.38, Suplemento 1, p. S1-S46 Abril 2012. Jornal Brasileiro de Pneumologia Abril 2012 volume).

### **QUESTÃO 32 – MANTER**

**JUSTIFICATIVA:** (De acordo com o manual de Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimp. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013, a lombalgia que piora à noite é um sinal de alerta sugestivo de câncer.

Para o diagnóstico das espondiloartropatias soronegativas deve-se identificar um conjunto de cinco informações: inclui lombalgia de caráter insidioso, duração maior do que três meses, rigidez matinal e melhora com a atividade física).

### **QUESTÃO 38 – MANTER**

**JUSTIFICATIVA:** De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde: 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2017, a transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas). O contágio é maior nos estágios iniciais da infecção, sendo reduzido gradativamente à medida que ocorre a progressão da doença. No entanto, essas lesões são pouco sintomáticas e passam despercebidas na maioria dos casos.

Não foi identificada outra alternativa incorreta, além da letra “b”).

#### **QUESTÃO 40 – MANTER**

**JUSTIFICATIVA:** (De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde: Volume único/Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. - 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2017, exantema cutâneo de localização variável, com ou sem prurido uma sintomatologia **inespecífica** da doença de Chagas).